

使用步骤

1. **设计 gRNA 靶点序列。**例如选择靶点序列 CCCCTCGGACCTCTCCTCCAGG, (识别序列一般选择 19bp, 红色 AGG 为 PAM 序列), 按照下列合成 Oligo。您也可以访问佰格网站(www.biogle.cn) 在线生成 Oligo 序列。

UP : 5' -TGATTGCCCTCGGACCTCTCCTCC

LOW: 5' -AAACGGAGGAGAGGTCCGAGGGCA


2. **制备 Oligo 二聚体。**将合成的 Oligo 加水溶解至 10 μM, 按下列反应体系混合后, 95°C 加热 3 分钟, 然后以约 0.2°C/秒缓慢降至 20°C (推荐采用 PCR 仪)。

Buffer Anneal	18 μl
UP Oligo	1 μl
Low Oligo	1 μl
Total	20 μl

3. **将 Oligo 二聚体构建至 CRISPR/Cas 载体。**按下列反应体系在冰上混合各个组分, 混匀后室温 (20°C) 反应 1 小时。

H ₂ O	6 μl
CRISPR/Cas Vector	2 μl
Oligo 二聚体	1 μl
Enzyme Mix	1 μl
Total	10 μl

4. **参考标准步骤转化大肠杆菌。**取 5 μl 反应液加到至少 50 μl 的感受态细胞中, 混匀后冰浴静置 30 分钟 (期间切勿晃动, 严格保持静置); 轻轻取出, 42°C 热激 60 秒, 立即置于冰上 2 分钟; 加入 500 μl SOB/LB, 37°C 200 rpm 培养 1 小时; 取适量菌液涂布于含有卡那霉素的 LB 平板上, 37°C 倒置过夜培养。



测序参考序列

根据下列序列合成测序引物测序，可参考使用该测序引物 5' -CCCAGTCACGACGTTGTA-3' 。

```
AAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAACGACGGCCAGTGCCAAGCTTCATTGGGAGTTTTTGTATC
TTGTTTCATAGTTTGTCCAGGATTAGAATGATTAGGCATCGAACCTTCAAGAATTTGATTGAATAAACATCTTCATTCTTAAGATATGAA
GATAATCTTCAAAGGCCCTGGGAATCTGAAAGAAGAGAAGCAGGCCATTTATATGGGAAAGAACAATAGTATTTCTTATATAGGCCAT
TTAAGTTGAAACAATCTTCAAAGTCCACATCGCTTAGATAAGAAAACGAAGCTGAGTTTATACAGCTAGAGTCGAAGTAGTGATTG-
-----19bp-Target-Sequence-----GTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTGAAAAAGTGGC
ACCGAGTCGGTGCTTTTTT
```

绿色序列: AtU6 Promoter

蓝色序列: SG-RNA Sequence

黄色: 测序引物